

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com


All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



LES CAUSES DE CECITE

DR S.A.OUARET
CHU BENI MESSOUS



I- INTRODUCTION/DEFINITIONS:

CECITE: $AV < 1/20$ avec correction.


MALVOYANCE: $3/10 > AV > 1/20$ (AC)

AMBLYOPIE FONCTIONNELLE:

- BAV uni ou bilatérale;
- Réversible avant un certain âge;
- Causée par une déprivation

II-LES CAUSES TRAUMATIQUES:

- une des causes les + fréquentes;
- Les lésion peuvent se localiser aux différents étages;
- Différents mécanismes: contusion, plaie, brulure...
- Circonstances: accident domestique, jeux, circulation...
- **Prévention+++**



III-CAUSES CORNEENNES

III/a-chez l'adulte:

Dystrophies cornéennes: kératocône+++

Affection acquise;

Ethiopathogénie mal élucidée;

Déformation cornéenne évolutive(différents stades);

Traitement en f() du stade;

Stade ultime: kératoplastie




IMAGE NETTE





IMAGE DEFORMEE



Dégénérescences cornéennes:

Kératites neuro-pralytiques;

Kératites par lagophtalmie;

Kératites sèches;

Infections cornéennes:

Virales: herpes+++

- Unilatérales;
- récidivantes;
- attention aux CTC+++

Bactériennes: abcès de cornée:

- .aff grave => perte fonctionnelle et anat du Go;
- .rechercher causes favorisantes(trauma, obstruction des VL, port de lentilles de contact...)
- . « **TRACHOME** »: entité particulière (endémie, transmission, TRT, prévention...)

Parasitaires: très graves

- .Imm dépression;
- .trauma avec CE végétal

III-b- chez l'enfant:

Scléro-cornée

Glaucome congénital avec mégalocornée opaque

Avitaminose A avec xerophthalmie

Les infections microbiennes de la cornée

IV- LES CAUSES CRISTALLINIENNES

IV-a-chez l'adulte: cataracte




Opacification du cristallin

Cécité réversible

Sénile, traumatique, pathologique ou compliquée

Totale ou subtotale(nucléaire, corticale, sous capsulaire...)

TRT exclusivement chirurgical



IV-b-chez l'enfant

CATARACTES CONGENITALES:

Uni+++ ou bilatérale

Précoc+++ ou tardive


Totale+++ ou subtotale

Trt chrg

DÉPLACEMENT DU CRISTALLIN: ECTOPIE

Diplopie monoculaire

Rechercher tjrs une path générale: Σ de Marfan+++



V-LES CAUSES VITREENNES

V-a- chez l'adulte

HIV: Rét. proliférante
déchirure rétinienne

Hyalite: inflammation du vitré (uvéite post et
intérmédiare)

V-b- chez l'enfant

persistance du vitré primitif

Hyalites

VI- LES CAUSES RETINIENNES

VI-a- chez l'adulte

RD

Micro angiopathie diabétique

En l'absence de dépistage+trt: cécité irréversible

Prévention+++


DMLA

Aff dégénérative après 50 ans

Non inflammatoires acquise

Deux formes:

- Sèche ou atrophique
- Humide ou exsudative




• Les occlusions vasculaires rétiniennes

Veineuses:

- centrale(OVCR) ou de branche(OBVR)
- Ischémique(grave) ou œdémateuse
- FDR: HTA, arterio sclérose, glaucome chronique, hyperviscosité sanguine...



Artérielles:

- centrale(OACR) ou de branche(OBAR)
- BAV brutale, profonde et irréversible
- Ischémie rétinienne aiguë
- FDR: valvulopathie calcifiée
trble du rythme
Plaque d'athérome
- tjrs : examen CV



Décollement de rétine(DR)

- Clivage entre les deux feuillets rétiniens
- BAV BRUTALE
- Soit par déchirure rétinienne+++ -> trt chrg (prevention+++)
- Soit DR tractionnel(RD compliqué-> trt chrg)
- Soit DR exsudatif(HTA maligne, uvéite postérieure... -> trt médical)



Les tumeurs

LE MELANOME MALIN DE LA CHOROIDE:

- Tumeur maligne grave
- Metastases+++
- Cécité par DR, HIV, occlusion vasculaire, envahissement du nerf optique...
- trt conservateur: Rx thérapie
- Trt radical: énucléation, exenteration


VI-b- chez l'enfant

RETINOPATHIE DES PREMATURES

- Bilatérale
- Oxygénation hyper Bar,
- Prolifération excessive du système vasculaire induite pr l'O₂
- Différents stades de gravité croissante
- Stades précoces: photo coagulation au laser ou cryoapplication s/AG
- Stade ultime : DR par traction (fibroplasie rétro-lentale) =>cécité bilatérale très difficile à traiter.

Les dégénérescences rétiniennes héréditaires

- Périphériques (rétinopathie pigmentaire+++ = dégénérescence des bâtonnets = trouble vision nocturne = HEMERALOPIE)
- ou centrales:
 - maladie de STARGARDT
 - maladie de Best
- Souvent notion de cas similaires dans la famille
- Pas de traitement efficace
- Conseil génétique+++




La chorio-rétinite toxoplasmique

- Infection materno-fœtale par *T.gondii*
- Foyer chorio-rétinite actif puis cicatriciel
- Réactivation possible après cicatrisation
- Souvent foyer central maculaire
- Dépistage obligatoire si séroconversion pdt la Gsse
- Trt si foyer actif

Les tumeurs

- Rétinoblastome+++
- T maligne grave (pc vital+++)
- Clinique :leucocorie, strabisme
- Souvent unilatéral(âge moyen 18 mois)
- pfs bilatéral(plus précoce)
- Mutation génétique prouvée
- trt conservateur: Rx thérapie, thérmothérapie...
- Trt radical: énucléation,exenteration



Wills Eye Hospital Atlas of Clinical Ophthalmology, Lippincott-Raven Publishers

VII- LES CAUSES NERVEUSES

VII-a- chez l'adulte

LES GLAUCOMES

- Cecité progressive à bas bruit= GPAO
- Cecité brutale= GPFA(urgence extrême)
- Dépistage et traitement précoce+++

Les neuropathies optiques

- Vasculaires: artéritiques: HORTON+++
non artéritiques: embolies artérielles
- Inflammatoires: SEP+++
- Toxiques: alcool, tabac, mdcts, benzéne...

Les tumeurs

Méningiomes du NO+++

Les atrophies optiques

- Souvent liées à des œdèmes papillaires
- Unilatérale: inflammatoire, vasculaire compression du NO...
- bilatérale: HIC, HTA maligne
- Devant tout oedeme papillaire ou atrophies optique : IMAGERIE ORBITO-CEREBRALE → ELIMINER UNE TUMEUR .

VII-a- chez l'enfant

Malformation de la tête du nerf optique et les neuropathies optiques héréditaires

Atrophie optique par HIC: tumeurs cérébrales, craniosténose


Les tumeurs du nerf optiques
Essentiellement les Gliomes du NO

VII-CONCLUSION


La cécité est un état dramatique qui peut survenir brutalement ou s'installer progressivement

- *irréversible* → aide psychologique, orientation socio-professionnelle;
- *Evitable* → dépistage, prévention;
- *curable*: → déployer tt les moyens thérapeutiques pour la guérir

Pays les plus développés



Pays les moins développés



Merci...